

ERRATA-CORRIGE

	Errata	Corrige																																																																																																																												
Pag. 115, figura 3.8																																																																																																																														
Pag. 115, figura 3.9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Modello di probabilità di X</th> <th>Parametro di disturbo μ</th> <th>Num. camp.</th> <th>Statistica-test</th> <th>Ipotesi alternative ad $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ e regioni di rifiuto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">$N(\mu, \sigma^2)$</td> <td>noto</td> <td>$n \leq 120$</td> <td>$Y_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n)}$ (*)</td> <td> $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y_0 > \chi^2_{n, \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha/2)}) \vee (Y_0 > \chi^2_{n, \alpha/2})$ </td> </tr> <tr> <td>incognito</td> <td>$n \leq 120$</td> <td>$Y'_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n-1)}$ (*)</td> <td> $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha/2)}) \vee (Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha/2})$ </td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Legge distributiva valida, comunque, per ogni n.</p>	Modello di probabilità di X	Parametro di disturbo μ	Num. camp.	Statistica-test	Ipotesi alternative ad $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ e regioni di rifiuto	$N(\mu, \sigma^2)$	noto	$n \leq 120$	$Y_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n)}$ (*)	$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y_0 > \chi^2_{n, \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha/2)}) \vee (Y_0 > \chi^2_{n, \alpha/2})$	incognito	$n \leq 120$	$Y'_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n-1)}$ (*)	$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha/2)}) \vee (Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha/2})$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Modello di probabilità di X</th> <th>Parametro di disturbo μ</th> <th>Num. camp.</th> <th>Statistica-test</th> <th>Ipotesi alternative ad $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ e regioni di rifiuto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">$N(\mu, \sigma^2)$</td> <td>noto</td> <td>$n \leq 120$</td> <td>$Y_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n)}$ (*)</td> <td> $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y_0 > \chi^2_{n, \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha/2)}) \vee (Y_0 > \chi^2_{n, \alpha/2})$ </td> </tr> <tr> <td>incognito</td> <td>$n \leq 120$</td> <td>$Y'_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n-1)}$ (*)</td> <td> $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha/2)}) \vee (Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha/2})$ </td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Legge distributiva valida, comunque, per ogni n.</p>	Modello di probabilità di X	Parametro di disturbo μ	Num. camp.	Statistica-test	Ipotesi alternative ad $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ e regioni di rifiuto	$N(\mu, \sigma^2)$	noto	$n \leq 120$	$Y_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n)}$ (*)	$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y_0 > \chi^2_{n, \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha/2)}) \vee (Y_0 > \chi^2_{n, \alpha/2})$	incognito	$n \leq 120$	$Y'_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n-1)}$ (*)	$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha/2)}) \vee (Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha/2})$																																																																																																
Modello di probabilità di X	Parametro di disturbo μ	Num. camp.	Statistica-test	Ipotesi alternative ad $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ e regioni di rifiuto																																																																																																																										
$N(\mu, \sigma^2)$	noto	$n \leq 120$	$Y_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n)}$ (*)	$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y_0 > \chi^2_{n, \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha/2)}) \vee (Y_0 > \chi^2_{n, \alpha/2})$																																																																																																																										
	incognito	$n \leq 120$	$Y'_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n-1)}$ (*)	$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha/2)}) \vee (Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha/2})$																																																																																																																										
Modello di probabilità di X	Parametro di disturbo μ	Num. camp.	Statistica-test	Ipotesi alternative ad $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ e regioni di rifiuto																																																																																																																										
$N(\mu, \sigma^2)$	noto	$n \leq 120$	$Y_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n)}$ (*)	$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y_0 > \chi^2_{n, \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y_0 < \chi^2_{n, (1-\alpha/2)}) \vee (Y_0 > \chi^2_{n, \alpha/2})$																																																																																																																										
	incognito	$n \leq 120$	$Y'_0 \sim_{(H_0)} \chi^2_{(n-1)}$ (*)	$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ R: $Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha}$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ R: $Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha)}$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ R: $(Y'_0 < \chi^2_{(n-1), (1-\alpha/2)}) \vee (Y'_0 > \chi^2_{(n-1), \alpha/2})$																																																																																																																										
Pag. 196, Tab 6.1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">clienti</th> <th colspan="5">item</th> <th>punteggi globali</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>...</th> <th>j</th> <th>...</th> <th>qk</th> <th>SCki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>x_{k11}</td> <td>x_{k21}</td> <td>...</td> <td>x_{kj1}</td> <td>...</td> <td>x_{kqk1}</td> <td>$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj1}$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>x_{k12}</td> <td>x_{k22}</td> <td>...</td> <td>x_{kj2}</td> <td>...</td> <td>x_{kqk2}</td> <td>$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj2}$</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>i</td> <td>x_{k1i}</td> <td>x_{k2i}</td> <td>...</td> <td>x_{kji}</td> <td>...</td> <td>x_{kqki}</td> <td>$\sum_{j=1}^{qk} x_{kji}$</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>x_{k1n}</td> <td>x_{k2n}</td> <td>...</td> <td>x_{kjn}</td> <td>...</td> <td>x_{kqn}</td> <td>$\sum_{j=1}^{qk} x_{kjn}$</td> </tr> </tbody> </table>	clienti	item					punteggi globali	1	2	...	j	...	qk	SCki	1	x_{k11}	x_{k21}	...	x_{kj1}	...	x_{kqk1}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj1}$	2	x_{k12}	x_{k22}	...	x_{kj2}	...	x_{kqk2}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj2}$	i	x_{k1i}	x_{k2i}	...	x_{kji}	...	x_{kqki}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kji}$	n	x_{k1n}	x_{k2n}	...	x_{kjn}	...	x_{kqn}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kjn}$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">clienti</th> <th colspan="5">item</th> <th>punteggi globali</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>...</th> <th>j</th> <th>...</th> <th>qk</th> <th>SCki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>x_{k11}</td> <td>x_{k21}</td> <td>...</td> <td>x_{kj1}</td> <td>...</td> <td>x_{kqk1}</td> <td>$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj1}$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>x_{k12}</td> <td>x_{k22}</td> <td>...</td> <td>x_{kj2}</td> <td>...</td> <td>x_{kqk2}</td> <td>$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj2}$</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>i</td> <td>x_{k1i}</td> <td>x_{k2i}</td> <td>...</td> <td>x_{kji}</td> <td>...</td> <td>x_{kqki}</td> <td>$\sum_{j=1}^{qk} x_{kji}$</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>x_{k1n}</td> <td>x_{k2n}</td> <td>...</td> <td>x_{kjn}</td> <td>...</td> <td>x_{kqn}</td> <td>$\sum_{j=1}^{qk} x_{kjn}$</td> </tr> </tbody> </table>	clienti	item					punteggi globali	1	2	...	j	...	qk	SCki	1	x_{k11}	x_{k21}	...	x_{kj1}	...	x_{kqk1}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj1}$	2	x_{k12}	x_{k22}	...	x_{kj2}	...	x_{kqk2}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj2}$	i	x_{k1i}	x_{k2i}	...	x_{kji}	...	x_{kqki}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kji}$	n	x_{k1n}	x_{k2n}	...	x_{kjn}	...	x_{kqn}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kjn}$
clienti	item					punteggi globali																																																																																																																								
	1	2	...	j	...	qk	SCki																																																																																																																							
1	x_{k11}	x_{k21}	...	x_{kj1}	...	x_{kqk1}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj1}$																																																																																																																							
2	x_{k12}	x_{k22}	...	x_{kj2}	...	x_{kqk2}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj2}$																																																																																																																							
...																																																																																																																							
i	x_{k1i}	x_{k2i}	...	x_{kji}	...	x_{kqki}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kji}$																																																																																																																							
...																																																																																																																							
n	x_{k1n}	x_{k2n}	...	x_{kjn}	...	x_{kqn}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kjn}$																																																																																																																							
clienti	item					punteggi globali																																																																																																																								
	1	2	...	j	...	qk	SCki																																																																																																																							
1	x_{k11}	x_{k21}	...	x_{kj1}	...	x_{kqk1}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj1}$																																																																																																																							
2	x_{k12}	x_{k22}	...	x_{kj2}	...	x_{kqk2}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kj2}$																																																																																																																							
...																																																																																																																							
i	x_{k1i}	x_{k2i}	...	x_{kji}	...	x_{kqki}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kji}$																																																																																																																							
...																																																																																																																							
n	x_{k1n}	x_{k2n}	...	x_{kjn}	...	x_{kqn}	$\sum_{j=1}^{qk} x_{kjn}$																																																																																																																							